

# DIAGNOSTIC PRECOCE DES CANCERS DE L'ENFANT

Affiche produite au Maroc par l'Association l'Avenir sous la responsabilité du Pr. Fouzi Msker Aloui à l'attention des médecins consultants d'enfants

## SPHERE ORL

Hypertrophie gingivale	Leucémie aigue Myéloïde Lymphome Non Hodgkinien (LNH)
Gingivorragies	Leucémie Aigue
Déchaussement dentaire	LNH, NBL, Histiocytose de Langherans
Bombement du palais	LNH
Hypertrophie unilatérale des amygdales	LNH, RMS
Occlusion ou saignement nasal	Cancer du Cavum (UCNT), RMS, LNH
Otitisme unilatérale	UCNT, RMS, Histiocytose de Langherans
Bourgeon du conduit auditif	RMS

## CRANE

Nodules	Métastase de NBL
Déformation	NBL, Tumeur Cérébrale
Zones molles	NBL, Histiocytose Langherans
Céphalée	Tumeur Cérébrale

## OEIL

Exophtalmie	Rhabdomyosarcome (RMS), Histiocytose de Langherans, Neuroblastome (NBL), Rétinoblastome (RB)
Ecchymoses palpébrales	NBL métastatique
Syndrome de Claude Bernard Homer	NBL thoracique haut
Aniridie	Néphroblastome
Leucocorie (œil de chat)	RB
Strabisme	RB, Tumeur Cérébrale
Nystagmus	Tumeur Cérébrale

## ABDOMEN

Splénomégalie homogène volumineuse	Leucémie Myéloïde Chronique
Splénomégalie homogène	Leucémie aigue, MDH
Splénomégalie nodulaire	MDH
Masses antérieures +/- ascite	LNH
Masses bien limitées	Néphroblastome
Contact lombaire	
Hépatomégalie	Hépatoblastome
Hépatomégalie nodulaire	NBL (Syndrome de Pepper)
Masses mobiles	Tumeur germinale de l'ovaire
Masses Médiane fixe	NBL

## COU

Adénopathies localisées	Maladie de Hodgkin (MDH), UCNT
Adénopathies généralisées récentes	Leucémie Aigue
Tumeur dure fixe latérale	NBL cervical
Tumeur molle	Angiome ou lymphangiome

## THORAX ET DOS

Tuméfaction pariétale	RMS, PNET, Sarcome d'Ewing costal
Gêne respiratoire	Adénopathies médiastinales, Tumeur pulmonaire, NBL, Ewing costal ou vertébral
Syndrome cave supérieur	LNH, MDH
Pleurésie	LNH

## AUTRES SIGNES CLINIQUES

Pâleur récente et mal tolérée	Leucémie aigue Aplasie Médullaire
Purpura récent	Leucémie Aigue Aplasie Médullaire
Ictère Récent sans fièvre	MDH / Compression des voies biliaires (tumeur ou ADP)
Fièvre persistante	MDH, Leucémie aigue, Aplasie médullaire
Polyurie Polydipsie	Craniopharyngiome, Histiocytose de Langherans
Diarrhée motrice	NBL
Nodules cutanés	Leucémie aigue, NBL
Paraplégie	LNH épidual, NBL en sablier
Paralysie des nerfs crâniens	Méningite blastique, Tumeur cérébrale
Céphalées en casque	
Hémiplégie	Tumeur Cérébrale
Vomissements en jet	

## PELVIS

Deux Gros testicules	Leucémie aigue, LNH
Un Gros testicule	Tumeur Germinale, RMS, LNH, Leucémie Aigue
Tuméfaction douloureuse du pelvis	Sarcome d'Ewing
Rétention urinaire/Dysurie	RMS vessie / prostate
Saignement ou bourgeon vulvaire	RMS vulve
Hématurie	Néphroblastome

## MEMBRES

Douleurs nocturnes localisées	
Fracture pathologique	Tumeur osseuse
Tuméfaction douloureuse	
Boiterie	
Douleurs osseuses diffuses	Métastase de NBL, Leucémie aigue
Tuméfaction localisée	RMS
Hémi hypertrophie corporelle	Néphroblastome

1. La liste de signes cliniques n'est pas exhaustive.
2. Ces signes peuvent être isolés ou associés.
3. Leur poids clinique dépend leur répétition, récurrence, leur persistance et l'absence d'autre diagnostic évident.
4. Le doute peut accompagner chacun de ces signes; son accompagnement facilitera le contact et l'examen.